


Parcul Național **Situl N2000** Semenic - Cheile Carașului



Contează pentru viitor!

Specii de amfibieni

1193 *Bombina variegata*

Habitat al unei specii - mediul definit prin factori abiotici și biotici, în care trăiește o specie în orice stadiu al ciclului biologic.

Specii de interes comunitar - speciile care pe teritoriul Uniunii Europene sunt:

- periclitate, cu excepția celor al căror areal natural este situat la limita de distribuție.
- vulnerabile, speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este probabilă într-un viitor apropiat dacă acțiunea factorilor perturbatori persist.
- rare, speciile ale căror populații sunt reduse din punctul de vedere al distribuției sau/și numeric.
- endemice, speciile de plante/animale care se găsesc exclusiv într-o regiune.
- specii prioritare - speciile pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate specială datorită proporției reduse a arealului acestora.

Sit de importanță comunitară - situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menținerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar prevăzute și care contribuie semnificativ la coerența rețelei "Natura 2000" și/sau contribuie semnificativ la menținerea diversității biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective.

Descriere: Corpul broaștei este aplatizat iar dimensiunile maxime sunt de 5 cm. Capul este mare, cu botul rotunjit. Culorile în partea dorsală sunt cenușiu, maroniu sau măsliniu. Abdomenul este colorat în galben cu pete cenușiu spre negru. Uneori pot apărea indivizi total sau parțial verzi în zona dorsală. Frecvența sunetelor este ridicată în timpul orăcăitului.

Ecologia speciilor: Specia se găsește de la 200 la 1.400m altitudine în bălți, mlaștini, turbării și malul pâraielor. Activitatea ei este diurnă și nocturnă, preponderent acvatică. Conviețuiește alături de un număr mare de indivizi și se reproduce de mai multe ori pe an. Ouăle le depune în grămezi mici fixate pe plante sau pe fundul apei. Se deplasează bine și pe uscat putând să colonizeze rapid noi habitate acvatice inclusiv acumulări artificiale de apă. Poate realiza aglomerări cu un număr mare de indivizi în mici bălți.

Distribuție: suprafețe cu apă curgătoare și stătătoare în Munții Semenicului și Aninei, inclusiv pe râul Caraș în zona de luncă.

