


Parcul Național **Situl N2000** **Semenic - Cheile Carașului**



Contează pentru viitor!

Specii de păsări

A072 *Pernis apivorus*

A080 *Circaetus gallicus*

A091 *Aquila chrysaetos*

A103 *Falco peregrinus*

A104 *Bonasa bonasia*

A215 *Bubo bubo*

A224 *Caprimulgus europaeus*

A234 *Picus canus*

A236 *Dryocopus martius*

A238 *Dendrocopos medius*

A239 *Dendrocopos leucotos*

A246 *Lullula arborea*

A320 *Ficedula parva*

A321 *Ficedula albicollis*

A325 *Parus palustris*

A326 *Parus montanus*

A338 *Lanius collurio*

A350 *Corvus corax*

A379 *Emberiza hortulana*

Habitat al unei specii - mediul definit prin factori abiotici și biotici, în care trăiește o specie în orice stadiu al ciclului biologic.

Specii de interes comunitar - speciile care pe teritoriul Uniunii Europene sunt:

- periclitate, cu excepția celor al căror areal natural este situat la limita de distribuție.
- vulnerabile, speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este probabilă într-un viitor apropiat dacă acțiunea factorilor perturbatori persist.

- rare, speciile ale căror populații sunt reduse din punctul de vedere al distribuției sau/și numeric.

- endemice, speciile de plante/animale care se găsesc exclusiv într-o regiune.

- specii prioritare - speciile pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate specială datorită proporției reduse a arealului acestora.

Sit de importanță comunitară - situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menținerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar prevăzute și care contribuie semnificativ la coerența rețelei "Natura 2000" și/sau contribuie semnificativ la menținerea diversității biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective.

Descriere: Lungimea corpului variază în funcție de specie, de la 13cm la 95cm iar greutatea este cuprinsă între 23g și 6,5kg. Anvergura aripilor poate fi de până la 225cm. Culoarea penajului diferă foarte mult de la o specie la alta însă predomină gri, maro, brun-întunecat, alb-negru. Longevitatea poate ajunge la 11 ani.

Ecologia speciilor: Majoritatea speciilor se hrănesc cu larve, insecte și semințe iar păsările răpitoare cu rozătoare, păsări, șopârle și șerpi. Unele păsări răpitoare au o activitate mai intensă noaptea, altele o au ziua. Construcția și amplasarea cuibului diferă în funcție de specie, pe teren în pajiști și tufărișuri, pe crengile arborilor, în scorburile arborilor uscați sau pe nișe în pereții de stâncă.

O parte din specii ierneză în Africa iar la revenirea în România își construiesc cuibul și depun 1-14 ouă care stau la incubat 18-35zile. Puii sunt dependenți de cuib și părinți între 27 și 50 de zile.

Distribuție: pajiști, tufărișuri, păduri în Munții Semenicului și Aninei, râul Caraș în zona de luncă.

